

Biotika[®]
Ricinus



Nematicida Botánico

Extracto de Higuera

Sin intervalo de seguridad

Producto de Cero Residuos



Bloquea la síntesis de proteína de insectos y nemátodos

Efecto nematicida y nematostático

Innofensivo con las personas

Amigable con el ambiente

No presenta período de reentrada

Control de pulgones y nemátodos



Acerca de:

Biotika® Ricinus es un nematocida e insecticida de origen botánico, diseñado para el control de nematodos fitoparásitos vía suelo y de insectos plaga vía foliar.

Biotika® Ricinus altera la permeabilidad de la membrana y exoesqueleto, provocando un desequilibrio en el metabolismo interno de la plaga. Además bloquea el su ministro de sustancias necesarias para su crecimiento. Se recomienda que el producto sea usado inmediatamente después de preparada la mezcla, aplicado vía sistema de riego, drench o vía foliar.

Beneficios

- Acaricida botánico** apto para su aplicación en cultivos orgánicos.
- Producto **100% orgánico**.
- Sin intervalo de seguridad**, 0 días a cosecha.
- Acción por contacto** e ingestión.
- No afecta** a la fauna benéfica.
- No afecta** a los polinizadores.
- No genera** problemas de salud en el personal de campo.
- Control de ácaros** e insectos chupadores.
- Producto de **Cero Residuos**.
- No presenta** período de reentrada a las zonas tratadas.

Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Tomate (SL) Papa (SL) Chile (SL)	Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne spp.</i>)	2-4 L/Ha.	Aplicación al suelo para el control de nematodos fitoparásitos. Repetir máximo cada 20 días.
Frutales (SL)	Mosca blanca (<i>Bemisia spp.</i>) Pulgones (<i>Aphididae</i>)	5 – 10 mL/L de agua	Aplicación vía foliar para el manejo de insectos chupadores, repetir según el grado de infestación de la plaga.
	<i>Tylenchulus sp.</i> <i>Radophulus sp.</i>	4 L/Ha.	Aplicación al suelo para el control de nematodos fitoparásitos. Repetir máximo cada 20 días.
Arándano, fresa, frambuesa, zarzamora (SL)	Mosca blanca (<i>Bemisia spp.</i>), Pulgones (<i>Aphididae</i>)	5 – 10 mL/L de agua	Aplicación vía foliar para el manejo de insectos chupadores, repetir según el grado de infestación de la plaga.

*Intervalo de seguridad, días entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: Inmediatamente después de que seque el rocío de la aplicación.

Composición

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: % EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:	
Extracto de higuera (<i>Ricinus communis</i>) (Etil dodecanoato).....	90.00 %
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyentes	10.00 %
TOTAL	100.00 %



Para más información:
fagro.mx/productos